

Versió executiva Guia Campanya de vacunació antigripal 2017

Aquest document és un resum de la *Guia tècnica per a la campanya de vacunació antigripal estacional 2017* que es pot consultar a:

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/contingut_responsiu/salutAZ/G/Grip/documents/arius/guia_tecnica_antigripal.pdf. Els punts a destacar són els següents:

La campanya de vacunació començarà el dilluns 23 d'octubre. Les recomanacions de vacunació per a la campanya 2017-2018 són, en general, similars a les de la campanya precedent, continua sense estar disponible la vacuna de cultiu cel·lular i es disposarà d'algunes dosis de vacuna tetravalent per a casos molt específics.

En la composició de la vacuna d'aquesta temporada hi ha una soca que ha canviat respecte a l'anterior, A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 que substitueix A/Califòrnia/7/2009 (H1N1)pdm09. Segons l'OMS, la vacuna antigripal trivalent recomanada per a la temporada gripal 2017-2018 a l'hemisferi nord ha d'incloure:

- **Una soca anàloga a A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09**
- **Una soca anàloga a A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)**
- **Una soca anàloga a B/Brisbane/60/2008 (l'inatge Victòria)**

L'OMS recomana que les vacunes quadrivalents, amb dues soques de virus B, portin també una soca anàloga a B/Phuket/3073/2013 (l'inatge Yamagata).

http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2017_18_north/en/

Grups de risc per vacunar

1. Persones d'edat igual o superior a 60 anys. Es farà especial èmfasi en aquelles persones que conviuen en institucions tancades.

2. Persones de menys de 60 anys que presenten un alt risc de complicacions derivades de la grip:

- Nens i nenes (de més de 6 mesos) i adults amb malalties cròniques cardiovasculars (excloent hipertensió arterial aïllada), neurològiques o pulmonars, incloent displàsia broncopulmonar, fibrosi quística i asma.
- Nens i nenes (de més de 6 mesos) i adults amb:
 - malalties metabòliques, inclosa diabetis mellitus



- obesitat mòrbida (índex de massa corporal ≥ 40 en adults, ≥ 35 en adolescents o ≥ 3 DE en la infància)
- insuficiència renal
- hemoglobinopaties i anèmies
- asplènia
- malaltia hepàtica crònica
- malalties neuromusculars greus
- immunosupressió (inclosa l' originada per la infecció de VIH, per fàrmacs o en els receptors de trasplantaments)
- càncer
- implant coclear o en espera de l'implant
- trastorns i malalties que comporten disfunció cognitiva: síndrome de Down, demències i altres.

En aquest grup es farà un especial èmfasi en aquelles persones que necessitin seguiment mèdic periòdic o que hagin estat hospitalitzades l'any precedent.

- Nens, nenes i adolescents, de 6 mesos a 18 anys, que reben tractament prolongat amb àcid acetilsalicílic, per la possibilitat de desenvolupar una síndrome de Reye després de la grip.
- Dones embarassades en qualsevol trimestre de gestació.

3. Persones que poden transmetre la grip a aquelles que tenen un alt risc de presentar complicacions:

- Treballadors dels centres, serveis i establiments sanitaris (incloses les oficines de farmàcia), tant d'atenció primària com especialitzada i hospitalària; pública i privada. Es farà especial èmfasi en aquells professionals que atenen pacients d'alguns dels grups d'alt risc anteriorment descrits.
- Persones que per la seva ocupació treballen en institucions geriàtriques o en centres d'atenció a malalts crònics, especialment els que tinguin contacte continu amb persones vulnerables.
- Estudiants en pràctiques en centres sanitaris.
- Persones que proporcionin cures domiciliàries a pacients d'alt risc o gent gran.
- Persones que conviuen a la llar, inclosos nens o nenes de més de 6 mesos d'edat, amb altres que pertanyen a alguns dels grups d'alt risc, per la seva condició clínica especial (esmentats al punt 2).



4. Altres grups en els quals es recomana la vacunació:

- Persones que treballen en serveis públics essencials, amb especial èmfasi en els subgrups següents:
 - Forces i cossos de seguretat de l'Estat, amb dependència nacional, autonòmica o local
 - Bombers
 - Serveis de protecció civil
 - Persones que treballen en els serveis d'emergències sanitàries
 - Treballadors d'institucions penitenciàries i d'altres centres d'internament per resolució judicial

- Treballadors directament exposats a aus o porcs, en granges o explotacions avícoles o porcines, i també a aus salvatges. La finalitat és reduir l'oportunitat de coinfecció de virus humà i aviar o porcí, disminuint la possibilitat de recombinació genètica d'ambdós virus.

Es recomana que les persones que pertanyen al grup de serveis públics essencials que siguin vacunades pels mateixos serveis sanitaris que els corresponguin.

Malgrat l'existència de recomanacions d'algunes institucions, es recorda que per a la campanya antigripal 2017-2018 no es considera grup de risc –a l'efecte de rebre la vacunació antigripal de manera sistemàtica– la població sana infantil o adulta menor de 60 anys, no inclosa en els apartats 1, 2 i 3.

Vacunes distribuïdes pel Departament de Salut per a la campanya de vacunació de 2017

La Generalitat de Catalunya adquireix les vacunes mitjançant un concurs públic. En el concurs d'aquest any, els lots de vacunes que han estat adjudicats són:

Vacunes fraccionades o de subunitats

- 600.000 dosis de vacuna Chiroflu® de Seqirus

Vacuna antigripal d'antigen de superfície inactivat

Vacunes d'immunogenicitat reforçada

- 286.000 dosis de vacuna Chiromas® de Seqirus

Vacuna antigripal d'antigen de superfície inactivat, amb adjuvant MF59C.1

- 314.000 dosis de vacuna Intanza® de 15 mcg de Sanofi Aventis



Vacuna antigripal de virus fraccionats inactivats d'administració intradèrmica.

Tot i això, el laboratori Seqirus ha comunicat que no disposarà de la totalitat de les dosis de la vacuna Chiroflu adjudicades que es substituiran per la vacuna **Afluria®** (vacuna de virus fraccionats per administrar a partir dels 5 anys) del mateix laboratori. Es pot consultar la fitxa tècnica en el següent enllaç:

https://www.aemps.gob.es/cima/dohtml/ft/78806/FichaTecnica_78806.html

Per aquest motiu es disposarà de 540.000 dosis de vacuna Afluria (amb agulla de bioseguretat integrada (aproximadament el 90% en presentació de caixes de 10 dosis i el 10% en presentació en caixes individualitzades) i de 60.000 dosis de vacuna Chiroflu® (50.000 dosis en caixes individualitzades i 10.000 dosis en caixes de 10 dosis), aquestes últimes per poder vacunar als infants.

Com a novetat per aquest any totes les vacunes es distribuïran amb sistemes de bioseguretat:

- Chiomas y Chiroflu: amb agulla de bioseguretat que es servirà amb les vacunes, però en caixes independents.
- Afluria: es servirà en presentació amb agulla de bioseguretat incorporada en l'empaquetat.
- Intanza: es servirà amb sistema de bioseguretat incorporat.

Veure indicacions per tipus de vacuna a la taula 1.

Taula 1. Indicació d'ús de la vacuna antigripal per tipus

Vacuna Grip	Edat recomanada	Via d'administració	Tipus Vacuna	Per a qui
Afluria®	A partir dels 5 anys	Intramuscular o subcutània profunda	Fraccionada	Per tota la població a vacunar de grip a partir dels 5 anys d'edat
Chiroflu®	A partir dels 6 mesos	Intramuscular o subcutània profunda	Subunitats	Utilitzar en infants i dones embarassades
Fluarix tetra®	A partir dels 3 anys	Intramuscular	Fraccionada	Prioritzar el seu ús en persones de molt alt risc (ús exclusiu en hospitals)
Chiromas®	A partir dels 65 anys (No hi ha estudis que validen la seva administració abans d'aquesta edat)	Intramuscular	Immunogenicitat reforçada (adjuvada)	Per a persones > 65 anys Prioritzar el seu ús en persones d'edat avançada o que pertanyin a grups de risc
Intanza® de 15 mcg	A partir dels 60 anys (No hi ha estudis que validen la seva administració abans d'aquesta edat)	Intradèrmica (id)	Immunogenicitat reforçada (id)	Per a persones > 60 anys Prioritzar el seu ús en persones d'edat avançada o que pertanyin a grups de risc. Si s'utilitza per pacients en tractament amb AO , cal recordar que aquesta presentació <u>no està indicada en menors de 60 anys.</u>

AO: anticoagulants orals