

CARNET DE SALUT



Generalitat
de Catalunya

/Salut

Carnet de Salut

Aquest CARNET de salut és per a ús exclusiu dels nens/es, de les seves famílies i dels seus professionals de la salut. És important tenir-lo al dia. Presenteu-lo al professional de pediatria quan li porteu el vostre fill/a.

Elaborat conjuntament amb la Societat Catalana de Pediatria.



Carnet de salut

Dades personals

Nom

Cognoms

Data i lloc de naixement

Domicili

Observacions importants

(malalties cròniques, al·lèrgies, limitacions, etc.)

Embaràs

Normal ☐ Patològic ☐

Observacions

Naixement

Centre sanitari

Al terme de setmanes de gestació Sexe M ☐ F ☐

Tipus de part ☐ eutòcic ☐ distòcic

APGAR Pes Talla PC

Grup sanguini Rh

Observacions perinatales

Antecedents familiars

Cribratge neonatal de la hipoacúsia

Factors de risc ☐ SI ☐ NO

Data	Data
Tècnica emprada	Tècnica emprada
Orella dreta: ☐ Passa ☐ No passa	Orella dreta: ☐ Passa ☐ No passa
Orella esquerra: ☐ Passa ☐ No passa	Orella esquerra: ☐ Passa ☐ No passa

☐ Seguiment equip pediatria
Valoració: - ☐ Risc d'hipoacúsia tardana
☐ Passa a diagnòstic

Cribratge neonatal de metabopaties congènites (Prova del taló)

Data d'extracció	espai per a l'etiqueta
Hora	

Resultats

Cribratge cardiopaties Cribratge hiperbilirubinèmia

SatO2 preductal (mà dreta)		Factors de risc ☐ SI ☐ NO		
SatO2 postductal (qualsevol peu)		<table><tr><td>Bilirubina (mg/dl)</td><td>Hores de vida</td></tr></table>	Bilirubina (mg/dl)	Hores de vida
Bilirubina (mg/dl)	Hores de vida			

Exploració del nadó. Problemes dels primers dies

Data de l'alta Pes a l'alta

Tipus d'alletament

Vacunes sistemàtiques

[illegible]

Vacunes

1. Difteria, tétanus i tos ferina acel·lular
2. Poliomièlitis
3. *Hæmophilus influenzæ* tipus b
4. Hepatitis B

5. Antipneumocòccica conjugada
6. Meningitis C conjugada
7. Meningitis B
8. Xarampió, rubèola i parotiditis

9. Varicel·la
10. Hepatitis A
11. Dif·tèria, tèt·nus i tos ferina acel·lular
12. Meningococ conjugada tetravalent (MACWY)

13. Virus del papil·loma humà
14. Tètanus i diftèria de tipus adult
15. Altres

Vacunes sistemàtiques

[illegible]

Vacunes

1. Difteria, tétanus i tos ferina acel·lular
2. Poliomièlitis
3. *Hæmophilus influenzæ* tipus b
4. Hepatitis B

5. Antipneumocòccica conjugada
6. Meningitis C conjugada
7. Meningitis B
8. Xarampió, rubèola i parotiditis

9. Varicel·la
10. Hepatitis A
11. Difèria, tètanus i tos ferina acel·lular
12. Meningococ conjugada tetravalent (MACWY)

13. Virus del papil·loma humà
14. Tètanus i diftèria de tipus adult
15. Altres

[illegible]

0-30 dies	2 mesos
Data	Data
Signatura	Signatura
Observacions	Observacions
4 mesos	6 mesos
Data	Data
Signatura	Signatura
Observacions	Observacions
7-9 mesos	12-15 mesos
Data	Data
Signatura	Signatura
Observacions	Observacions
18 mesos	2 anys
Data	Data
Signatura	Signatura
Observacions	Observacions

Creixement i desenvolupament

[illegible]

3-4 anys	6 anys
Data	Data
Signatura	Signatura
Observacions	Observacions
8 anys	12-14 anys
Data	Data
Signatura	Signatura
Observacions	Observacions
Alta pediàtrica	
Data	
Signatura	
Observacions	

Creixement i desenvolupament

Patologia aguda

Exantera sobtat	
Megaloeritema	
Varicel·la	

[illegible]

Patologia crònica

[illegible]

Seguiment per risc i/o patologia crònica

Motiu del seguiment

Professionals (Nom i Centre)

[illegible]


Incidències, malalties d'interès i hospitalització

[illegible]

Pathologies

Taula de desenvolupament psicomotor

(basada en l'estudi Llevant)



Protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut a l'edat pediàtrica

		Edat											
Exploracions		0/30 dies	2 mesos	4 mesos	6 mesos	7/9 mesos	12/15 mesos	18 mesos	2 anys	3/4 anys	6 anys	8 anys	12/14 anys
Cribatge	Somatometria												
	Salut mental												
	Desenvolupament psicomotor												
	Aparell locomotor												
Consell de salut	Alimentació												
	Cura i higiene												
	Tòxics												
	Seguretat i prevenció de lesions												
	Desenvolupament												

Aquesta taula és un recordatori dels ítems que componen el Protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut a l'edat pediàtrica



1. S'ha d'administrar la vacuna **DTPa-PI** als 2 anys d'edat dels infants vacunats amb vacuna bivalent des de 2,11 mesos. Els vacunats amb la pauta anterior, des de 6,18 mesos, rebran una dosi de 2 anys d'edat.
2. **Contra el meningococ *Neisseria meningitidis* tetravalent (MWCV):** Els vacunants més adolescents d'11-12 anys d'edat que no hagin rebut cap dosi de la vacuna MWCV des dels 10 anys d'edat. Es farà a requesta fins als 18 anys d'edat als centres de salut.
3. Vacuna contra **Pharyngitis A (HA)** (V): Només es vacunaran als 11-12 anys d'edat dels infants no vacunats o parcialment vacunats (la pauta vacunal consta de dues dosis).
4. Vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH): Es vacunaran només les noies amb dues dosis.
5. S'ha d'administrar la vacuna **dTPa** a les embarassades, en cada embaràs, al més aviat possible a partir de la setmana 27 de gestació.

[illegible]

061 / Salut Respon