


Bronquiolitis

Què n'has de saber?



Què és?

És la **inflamació** de les petites vies respiratòries del pulmó, els **bronquiols**.
Afecta sobretot lactants de 2 a 6 mesos i, en general, infants **menors de 2 anys**.

Quina simptomatologia té?



Quadre catarral
amb mucositat nasal



Febre
o febrícula



Tos i dificultat
respiratòria



El nadó es fatiga
i li costa menjar

Quina durada té?

La **durada** de la malaltia és de **7 a 10 dies**.



Estigues **alerta** si el nadó té **tos persistent, dificultat respiratòria** (se li marquen molt les costelles quan respira), menja poc (a penes mulla el bolquer) i està **queixós** o **poc actiu**.
En aquestes situacions, truqueu al **061 /Salut respon**.

Què fer?



No se li han d'administrar **xarops** per a la tos, **mucolítics** ni **antibiòtics**.



Sí que es poden administrar **antitèrmics** en el cas que li pugui la febre.
Cal mantenir el **nadó hidratat** i fer-li rentats nasals.



Com es pot prevenir?



Higiene
freqüent de mans
i de joguines



Mascareta
si tens símptomes
de refredat



Ventilació



Evita que el nadó
romangui en
entorns on es fumi



Evita dur el nadó
en **espais tancats**
i **amb molta gent**



Per a més informació, consulta
canalsalut.gencat.cat/bronquiolitis