


Protocol de les activitats per al
cribratge del càncer de coll uterí a l'atenció primària

INDICACIONS PER A LA DETECCIÓ DEL VPH D'ALT RISC




**SEGUIMENT D'UNA PROVA PRÈVIA POSITIVA DE VPH →
només 1 any després d'haver obtingut el resultat positiu.**

La prova del VPH és opcional EN ELS CASOS D'AGUS

**NO S'HA DE FER LA PROVA DE DETECCIÓ DEL VPH en dones amb diagnòstic de LSIL, HSIL →
CAL SEGUIR PROTOCOLS D'ACTUACIÓ CLÍNICS**

Protocolo de las actividades para el
cribrado de cáncer de cuello de útero en atención primaria a Catalunya

INDICACIONES PARA LA DETECCIÓN DEL VPH DE ALTO RIESGO



SEGUIMIENTO DE UNA PRUEBA PRÉVIA POSITIVA DE VPH →
Sólo 1 año después de haber obtenido el resultado positivo.

La prueba de VPH es opcional **EN LOS CASOS DE AGUS**

NO REALIZAR LA PRUEBA DE DETECCIÓN DE VPH en mujeres con diagnóstico de LSIL, HSIL →
SEGUIR PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN CLÍNICAS