

RECOMANACIONS DE CAPTACIÓ ACTIVA DE VACUNACIÓ DURANT LES DIFERENTS FASES DE DESCONFINAMENT DAVANT L'ESTAT D'ALARMA PEL SARS-CoV-2 (COVID-19)

L'11 de març de 2020 l'OMS va declarar l'estat de pandèmia i això va derivar en una crisi sanitària d'abast internacional i sense precedents, i mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, es va declarar l'estat alarma a tot l'Estat espanyol per a la gestió de la situació d'emergència de salut pública.

Per tal d'evitar un agreujament de la crisi sanitària, des de l'OMS s'insisteix en la necessitat de continuar la vacunació i/o adaptar els plans de vacunació dels diferents països per evitar casos de les malalties que es poden prevenir mitjançant la vacunació incloses en les recomanacions de cada país. Es pot consultar el document a:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331590/WHO-2019-nCoV-immunization_services-2020.1-eng.pdf?ua=1

Per tal d'establir les recomanacions de vacunació durant la situació d'emergència de salut pública, el dia 12 de març de 2020, la Secretaria de Salut Pública va fer remetre una nota informativa als centres sanitaris amb les recomanacions sobre les actuacions de prevenció i promoció de la salut davant la situació epidemiològica actual en relació amb el coronavirus SARS-CoV-2, en què insistia en la importància de la vacunació i ressaltava que és prioritari continuar la vacunació dels infants menors de quinze mesos, de les dones embarassades i les persones amb condicions de risc on no es pugui ajornar la vacunació.

També s'han fet notes informatives per als professionals i ciutadans per insistir en la importància i prioritats de vacunació, tant des del Ministeri de Sanitat com des del Servei Català de la Salut, que es poden consultar en aquests enllaços:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/COVID-19_Vacunacionprioritaria1.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/COVID-19_Vacunacionprioritaria2.pdf

<http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/acces-centres-sanitaris.pdf>

En aquests moments, és important restablir les vacunacions incloses al calendari de vacunacions sistemàtiques i de la resta de vacunes recomanades en condicions de risc, ja que s'ha observat una disminució de l'administració de vacunes que cal recuperar per evitar el risc d'aparició de brots, atès que mantenir les cobertures és fonamental per continuar tenint una molt baixa incidència de malalties vacunables. Caldrà, però, tenir en compte els recursos dels centres sanitaris per a poder recuperar aquesta activitat i al mateix temps, garantir la seguretat dels usuaris i seguir les instruccions establertes pel Departament de Salut i CatSalut pel que fa als recursos i recomanacions tenint en compte les diferents fases del desconfinament lligades a l'estat d'alarma.

En aquest sentit en el marc de la Ponència de vacunes de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut s'ha elaborat una nota informativa amb les prioritats del Programa de vacunacions durant les fases de transició de la pandèmia de la COVID-19. La nota està disponible a:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunacione/s/docs/COVID-19_Vacunacionprioritaria2.pdf

A partir d'aquests documents es considera que cal restablir la vacunació sistemàtica i no sistemàtica, i, per aquest motiu, cal aprofitar la captació oportunista davant de qualsevol visita al centre sanitari per vacunar a qualsevol edat i sempre que sigui possible. A més, s'han establert recomanacions de captació activa per revisar l'estat vacunal de la població que hauria d'haver rebut alguna dosi i poder vacunar els infants i adults segons les diferents fases de desconfinament.

Recomanacions de captació activa (vacunació) segons les fases de desconfinament

Cal tenir en compte que a les recomanacions de captació activa establertes per a cada fase, s'afegeixen les recomanacions de la fase precedent. En aquest sentit, és important garantir fer una cerca activa dels infants no vacunats en cada una de les fases i recomanacions.

Fase 0

- Captació activa dels infants segons el [calendari de vacunacions sistemàtiques](#) fins als quinze mesos inclosos.
- Captació activa de les dones embarassades per administrar la vacuna dTpa segons les recomanacions establertes.
- Vacunació de les persones amb condicions d'alt risc. Els professionals sanitaris valoraran la possibilitat de posposar la vacunació sempre que no hi hagi un risc immediat.
- Vacunació de contactes en cas de brot.

Fase 1

- Captació activa dels infants segons el calendari de vacunacions sistemàtiques fins als tres anys inclosos.

Fase 2

- Captació activa dels infants segons el calendari de vacunacions sistemàtiques fins als sis anys inclosos.

Fase 3

- Restabliment de les vacunes incloses al calendari de vacunacions sistemàtiques, exceptuant la vacunació que s'efectua als centres educatius.

Tal com estableix el calendari de vacunacions vigent, cal iniciar la vacunació des dels 16 anys fins als 18 anys amb la vacuna MACWY.

- Captació activa de les persones amb condicions d'alt risc segons les recomanacions del [manual de vacunacions](#).

Taula resum amb les recomanacions de vacunació segons fase de desconfinament:

	Fase 0	Fase1	Fase 2	Fase 3
Infants fins als quinze mesos inclosos				
Vacunació en condicions d'alt risc				
Vacunació de dones embarassades				
Vacunació fins als tres anys inclosos				
Vacunació fins als sis anys inclosos				
Resta de vacunacions sistemàtiques*				
Resta vacunacions en condicions de risc				

*Excepte les vacunes que s'administren als centres educatius

La vacunació que es du a terme en els centres educatius es reprendrà amb el nou curs escolar 2020-2021 i s'administraran les vacunes que no s'han pogut administrar durant el curs 2019-2020 (segones dosis de VPH, hepatitis A i varicel·la i vacuna Td i MACWY) per tal d'evitar visites als centres sanitaris i també per a garantir la seguretat dels alumnes, així com per garantir una cobertura òptima de les vacunes

que s'administren. En aquest sentit, està previst enviar una nota informativa a les famílies d'alumnes de 6è de primària i 2n d'ESO per informar de la situació.

S'haurà de tenir en compte que aquestes recomanacions es poden modificar segons l'evolució dels casos de la COVID-19 i per les recomanacions establertes pel Departament de Salut.

Mesures a tenir en compte per a la vacunació

Per tal de garantir les mesures higièniques i la seguretat dels usuaris, caldrà tenir en compte:

- Respectar les recomanacions establertes pel Servei Català de la Salut en matèria de funcionament dels centres sanitaris.
- Respectar la normativa vigent pel que fa a la utilització de mascaretes de la població general (Ordre SND/422/2020 de 19 de maig) i altres mesures preventives.
- Establir horaris de vacunació per evitar el contacte dels infants i les persones a vacunar *sanes* amb les persones infectades pel SARS-CoV-2 o altres patologies infeccioses. És preferible habilitar la primera hora del dia per dur a terme les vacunacions.
- Habilitar espais diferenciats (consultes diferents) per atendre les persones infectades pel SARS-CoV-2 i altres patologies i per a l'administració de les vacunes.

Vacunació i infecció per la COVID-19

En relació amb la vacunació de les persones que han tingut la infecció per la COVID-19 i contactes estrets cal tenir en compte que:

- No es coneixen contraindicacions mèdiques per a vacunar a persones que han superat la infecció per la COVID-19. No és necessari esperar cap temps determinat, no obstant això i per a minimitzar el risc de transmissió, es recomana posposar la vacunació fins després dels dies d'aïllament recomanats sempre que se n'hagi resolt el quadre clínic.
- Els contactes estrets d'un cas confirmat es poden vacunar una vegada superat el període de quarantena establert sense desenvolupar simptomatologia.

- No s'han de demorar les vacunes que tenen un termini curt i definit per a la seva administració (per exemple, la vacunació enfront de la tos ferina en embarassades en la setmana 27-28), ja que es pot perdre l'oportunitat d'una vacunació a temps.

Sub-direcció general de Promoció de la Salut

Barcelona, 27 de maig de 2020