

Indicacions	Vàlids n (%)	Mínim	Màxim	Mediana (RI)	Homogeneïtat %	Puntuació ≥7 n (%)
Càncer de pulmó: diagnòstic/estadificació	29 (96,7)	8	9	9 (9-9)	98,1	29 (100,0)
Limfoma: diagnòstic/estadificació	27 (90,0)	5	9	9 (8-9)	83,5	24 (88,9)
Tumor d'origen desconegut diagnòstic	29 (96,7)	5	9	8 (7-8)	84,5	24 (82,8)
Limfoma: avaluació de la resposta al tractament	27 (90,0)	5	9	8 (7-9)	81,5	23 (85,2)
Limfoma: recidiva/reestadificació	27 (90,0)	3	9	8 (8-9)	75,7	24 (88,9)
Càncer d'esòfag: diagnòstic/ estadificació	29 (96,7)	2	9	8 (7-9)	75,3	25 (86,2)
Càncer de pulmó: PET/TC amb contrast	28 (93,3)	2	9	8(7-8,5)	68,3	24 (85,7)
Càncer de pulmó: recidiva/reestadificació	29(96,7)	3	9	8 (6-9)	67,1	21 (72,4)
Tumor de l'estroma gastrointestinal (GIST): recidiva/reestadificació	28 (93,3)	1	9	8 (7-8)	62,0	22 (78,6)
Nòdul pulmonar solitari: diagnòstic/estadificació	28 (93,3)	1	9	8 (8-9)	59,5	26 (92,9)
Càncer colorectal: recidiva/reestadificació	29 (96,7)	3	9	7 (7-8)	67,5	23 (79,3)
Síndrome paraneoplàstica: localització del tumor	29 (96,7)	3	9	7 (6-8)	65,2	20 (69,0)
Càncer de cap i coll: recidiva/reestadificació	29 (96,7)	2	9	7 (6-8)	64,8	19 (72,4)
Càncer de pulmó: planificació de radioteràpia	28 (93,3)	3	9	7 (5-8)	63,6	16 (57,1)
Càncer d'esòfag: recidiva/reestadificació	29 (96,7)	3	9	7 (6-8)	63,2	19 (65,5)
Càncer de cap i coll: PET/TC amb contrast	28 (93,3)	2	9	7 (5,5-8)	59,0	18 (64,3)
Càncer d'esòfag: avaluació de la resposta al tractament	29 (96,79)	1	9	7 (5-8)	44,7	15 (51,7)