

Indicacions	Vàlids n (%)	Mínim	Màxim	Mediana (RI)	Homogeneïtat %	Puntuació ≥7 n (%)
Càncer de cap i coll: diagnòstic/estadificació	29 (96,7)	2	9	6 (5-7)	66,4	11 (37,9)
Càncer de pulmó: avaluació de la resposta al tractament	29 (96,7)	1	9	6 (5-7)	63,2	12 (41,4)
Càncer de tiroides: recidiva/reestadificació	28 (93,3)	2	9	6 (4-7)	62,4	10 (35,7)
Melanoma: recidiva/reestadificació	29 (96,7)	1	9	6 (5-8)	59,0	11 (37,9)
Càncer de testicle: recidiva/reestadificació	29 (96,7)	1	9	6 (6-7)	59,0	14 (48,3)
Càncer de cap i coll: avaluació de la resposta al tractament	29 (96,7)	1	9	6 (5-7)	58,6	9 (31,0)
Melanoma: diagnòstic/estadificació	28 (93,3)	1	9	6 (4,5-7)	55,6	11 (39,4)
Càncer renal: recidiva/reestadificació	29 (96,7)	1	9	6 (3-7)	54,7	8 (27,6)
Càncer d'endometri: recidiva/reestadificació	29 (96,7)	1	8	6 (4-7)	54,2	9 (31,0)
Càncer d'ovari: recidiva/reestadificació	29 (96,7)	2	9	6 (6-8)	53,3	11 (37,9)
Càncer de cèrvix: recidiva/reestadificació	29 (96,7)	1	9	6 (5-7)	52,4	9 (31,0)
Tumors cerebrals:diferenciar radionecrosi de recidiva tumoral	27 (90,0)	1	9	6 (5-7)	51,0	12(44,4)
Càncer de mama: recidiva/reestadificació	29 (96,7)	2	9	6 (4-7)	45,2	12 (41,4)
Sarcomes: avaluació resposta al tractament	28 (93,3)	1	9	6 (3,5-7)	33,8	11 (39,3)
Tumor de l'estroma gastrointestinal (GIST): avaluació de la resposta al tractament	28 (93,3)	1	9	6 (6,5-9)	33,3	21 (75,0)
Càncer de pàncrees: recidiva/reestadificació	29 (96,7)	2	9	6 (2-7)	31,7	11 (37,9)
Tumors neuroendocrins: recidiva/reestadificació	29 (96,7)	3	8	5 (3-6)	76,3	4 (13,8)
Càncer colorectal: avaluació de la resposta al tractament	28 (93,3)	1	9	5 (3-7)	50,1	8 (28,6)
Càncer colorectal: diagnòstic/estadificació	29 (96,7)	1	9	5 (3-7)	46,7	8 (27,6)
Càncer de mama: avaluació de la resposta al tractament	29 (96,7)	1	9	5 (2-6)	44,7	6 (20,7)