

Preguntes freqüents.

Interrupció voluntària de l'embaràs farmacològica

Dolor abdominal

El dolor més sever apareix entre les 2 - 4 hores després de la presa del misoprostol. És un dolor de tipus còlic, semblant al d'una menstruació dolorosa, amb una duració aproximada d'1 hora. Cal seguir la pauta analgèsica prescrita i, si el dolor persisteix, contactar amb el centre sanitari de referència.

Sagnat vaginal

Durant les primeres 24 hores, el sagnat és abundant, similar a una menstruació abundant, i anirà disminuint progressivament.

Vòmit

El vòmit no afecta l'absorció del misoprostol, ja que no s'absorbeix per via digestiva. Pot afectar l'absorció de l'analgèsia. Cal repetir la dosi si el vòmit es produeix abans dels 60 minuts posteriors a la presa.

No hi ha sagnat vaginal

Si a les 6 hores no s'ha produït sagnat, pot significar que la medicació no ha funcionat. Cal contactar amb centre sanitari de referència en les properes 12 hores.

Amenorrea de més de 50 dies

Si en els 50 dies posteriors a la intervenció no heu tingut la menstruació cal contactar amb centre sanitari de referència.

Possibles efectes adversos

- dolor abdominal
- sagnat vaginal abundant
- nàusees i vòmits
- diarrea
- augment de la temperatura fins a 38,5° C, que es normalitza a les 2 hores

Signes d'alarma per acudir al centre sanitari de referència

- dolor pelvià intens que no cedeix amb l'analgèsia pautada
- sagnat abundant que requereix més de 2 compreses grans cada hora durant més de 3 hores sense que el sagnat cedeixi
- absència de sagnat en les 6 hores posteriors a la presa del misoprostol
- febre superior a 38° C durant més de 2 hores.