

On es fa l'IVE?

Sempre en centres sanitaris acreditats.

Com es pot accedir a la prestació de l'IVE en el sistema sanitari públic?

La sol·licitud de l'IVE s'ha de fer en les unitats d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR).

En els embarassos de risc, aquesta sol·licitud també es pot adreçar als hospitals maternoinfantils de la xarxa d'hospitals d'utilització pública (XHUP).

Com es pot accedir a la prestació de l'IVE en el sistema sanitari privat?

Es pot anar a una de les clíniques acreditades per a l'IVE. El cost s'ha de pagar on es dugui a terme el procediment.

És confidencial l'avortament?

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, garanteix la confidencialitat absoluta en relació amb l'IVE.

On es pot trobar més informació sobre aquest tema?

- A CatSalut Respon, durant les 24 hores del dia

061 CatSalut
Respon

- A **Canal Salut**, en l'apartat La salut de la A a la Z, a les fitxes que contenen informació sobre els temes següents:

- ✓ Contracepció
- ✓ Infeccions de transmissió sexual
- ✓ Interrupció voluntària de l'embaràs
- ✓ Salut sexual
- ✓ Sexe joves

Aquesta informació es pot trobar a:

<http://canalsalut.gencat.cat/>

Interrupció voluntària de l'embaràs



Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs

Interrupció voluntària de l'embaràs

Què és una interrupció voluntària de l'embaràs (IVE)?

És la finalització de l'embaràs per decisió de la dona, realitzada per professionals mèdics o sota la seva direcció i d'acord amb la normativa legal vigent.

Quina és la normativa actual de l'IVE?

La normativa és la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs.

Aquesta llei té els objectius de garantir els drets fonamentals en l'àmbit de la salut sexual i reproductiva, i de regular les condicions de la interrupció voluntària de l'embaràs i l'accés a aquesta prestació.

També estableix mesures per garantir l'educació sexual, per millorar l'accés als mètodes contraceptius i per disposar de programes i serveis de salut sexual i reproductiva específics.

En quins casos es pot sol·licitar l'IVE?

a) Durant les primeres 14 setmanes de gestació a petició de la dona.

En aquest cas, és important la informació per poder decidir de forma autònoma i és obligat el període de reflexió de tres dies entre la informació i la realització de l'IVE.

b) Fins a les 22 setmanes de gestació, quan hi hagi causes mèdiques:

- Greu risc per a la vida o la salut de la dona.
- Risc de greus anomalies en el fetus.

c) Quan es detectin:

- Anomalies fetals incompatibles amb la vida.
- Una malaltia extremadament greu i incurable en el moment del diagnòstic i així ho confirmi un Comitè clínic.

Com es fa un avortament?

Tècnica farmacològica

S'administra un fàrmac que atura la progressió de l'embaràs. Unes hores més tard s'administra un altre fàrmac que estimula les contraccions uterines i la dilatació cervical fins a l'expulsió del contingut uterí.

Tècnica quirúrgica

Amb l'utilatge adequat es dilata el coll uterí i se succiona o s'extreu el contingut de l'úter.

Les tècniques farmacològiques i quirúrgiques combinades s'utilitzen, en alguns casos, per facilitar la finalització de l'embaràs i l'evacuació de l'úter.

L'aplicació d'un mètode o d'un altre té a veure amb les setmanes de gestació, amb les característiques de cada dona i amb la seva decisió.

Què passa després d'una IVE?

És normal un sagnat irregular i molèsties similars a una regla després de la intervenció.

Són signes d'alarma el sagnat hemorràgic, un dolor molt fort, la febre de 38°C o més. En aquests casos, cal tornar al lloc on s'ha practicat l'IVE o a l'hospital més pròxim.

La regla sol venir entre les quatre o sis setmanes després de l'IVE.

Què s'ha de fer després d'una IVE?

Durant les dues primeres setmanes després de l'IVE, són millors la **dutxa** que el bany, les **compreses** que els tampons i les **relacions sexuals sense penetració**.

Cal sol·licitar una visita a l'ASSIR per prevenir un nou embaràs no desitjat i les infeccions de transmissió sexual (ITS).

A l'iniciar relacions sexuals amb penetració, fins a decidir el mètode, **cal utilitzar preservatius masculins o femenins**.

Recordeu que sempre podeu telefonar a Sanitat Respon, o anar a l'ASSIR o al CAP.