

Vacuna COVID-19 Pfizer/BioNTech - Comirnaty



Com actua?

- Utilitza ARN missatger basat en el genoma de la COVID-19.
- Produeix immunitat combinada: humoral i cel·lular.
- Eficàcia del 95%, 7 dies després de la segona dosi



Presentació i conservació

- Vial multidosi amb els que s'obtenen 6 dosis de 0,3 ml.
- Cada vial s'ha de diluir amb 1,8 ml de sèrum salí al 0,9%.
- Conservar a -70 °C, màxim 9 mesos.
- Es poden transportar sense obrir entre -25 °C i -15 °C, màxim 2 mesos.
- Descongelar abans de la dilució. Pot estar entre 2 °C i 8 °C durant 1 mes.
- Abans d'utilitzar, el vial pot conservar-se a menys de 30 °C un màxim de 2 hores.
- **No s'ha de tornar a congelar.**



A qui es pot administrar?

Indicada

- Des dels 12 anys.

Contraindicada

- Hipersensibilitat greu a alguna dosi prèvia o algun dels components.



Administració

- Intramuscular.
- Dues dosis de 0,3 ml.
- Interval entre dosis: almenys 3 setmanes (21 dies).



Efectes adversos

- Reportar-los al sistema de farmacovigilància.
- Es resolen pocs dies després de la vacunació, són lleus o moderats, i es pot fer servir tractament simptomàtic:

- Sensibilitat o dolor al lloc de la injecció
- Febre o febrícula
- Fatiga
- Maldecap

- Calfreds
- Nàusees
- Dolor articular o muscular

Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/vacuna-pfizer