



Preguntes freqüents per a la ciutadania

Suspensió cautelar i temporal de la vacuna amb Oxford/AstraZeneca

Vacunació

COVID-19 Catalunya



ÍNDEX

1. Per què s'ha suspès la vacunació amb la vacuna d'Oxford/AstraZeneca?	3
2. Hi ha un lot defectuós d'Oxford/AstraZeneca?	3
3. Quants dies he de vigilar si m'he vacunat amb una d'aquestes vacunes?	4
4. Quin risc tinc si m'he posat aquesta vacuna?	4
5. Tinc efectes secundaris, on he d'anar?	4
6. No tinc efectes secundaris, m'han de fer un seguiment?	5
7. Si he de posar-me la vacuna, què haig de fer?	5
8. Tinc programada la primera dosi amb Oxford/AstraZeneca. Què faig?	5
9. No la tinc programada, però sóc d'un col·lectiu prioritzat per vacunar-se que es vacunarà amb la d'Oxford/AstraZeneca. Què passarà? Hauré d'esperar o em posaran una altra vacuna?	5
10. M'han vacunat amb la 1a dosi d'Oxford/AstraZeneca. Què passa amb la segona?	6
11. M'he posat les dues dosis d'Oxford/AstraZeneca. De moment no he tingut símptomes. M'he de preocupar? Puc tenir reaccions adverses?	6
12. M'he posat la 1a/2a dosi de la vacuna d'Oxford/AstraZeneca i tinc símptomes. Què he de fer?	6



Preguntes freqüents per a la ciutadania

Suspensió cautelar i temporal de la vacuna amb Oxford/AstraZeneca

1. Per què s'ha suspès la vacunació amb la vacuna d'Oxford/AstraZeneca?

Perquè en els darrers dies s'han rebut algunes notificacions de trombosis venoses cerebrals en persones vacunades que és necessari estudiar més a fons, ja que són molt poc freqüents en la població general.

S'estima que més de 17 milions de persones han rebut aquesta vacuna a la Unió Europea i el Regne Unit, i el nombre de casos és molt baix.

A la Unió Europea, s'han administrat almenys 6 milions de dosis i s'han notificat 11 casos. Pel que fa a Espanya, segons l'informe d'activitat del 15 de març, s'han administrat 939.534 dosis de la vacuna d'Oxford/AstraZeneca, i s'ha notificat fins al moment només un cas en aquesta situació, la qual cosa representa el 0,00011% de les persones vacunades amb aquesta vacuna.

Aquests casos han aparegut durant les setmanes posteriors a l'administració de la vacuna, però això no vol dir que hi hagi una relació causal. L'Agència Europea de Medicaments els està estudiant en profunditat per veure si hi ha una relació causa-efecte.

2. Hi ha un lot defectuós d'Oxford/AstraZeneca?

En un principi es va suspendre un lot de la vacuna en alguns països, però atès que no s'ha trobat una relació concreta amb un d'aquests, s'ha considerat prudent suspendre a



Dimarts, 16 de març de 2021

partir de demà dimarts, 16 de març, i durant dues setmanes la vacunació amb qualsevol lot d'Oxford/AstraZeneca.

3. Quants dies he de vigilar si m'he vacunat amb una d'aquestes vacunes?

Les reaccions adverses amb aquest tipus de vacunes són normalment lleus o moderades, són més freqüents els primers dies i desapareixen al cap d'uns dies després de la vacunació. Un dels símptomes més habituals és el mal de cap. Malgrat això, si t'han vacunat durant els darrers 14 dies i tens un mal de cap molt intens, que canvia de forma clara en tombar-te o s'associa a alteracions visuals o altres símptomes neurològics persistents, cal consultar el teu metge o metgessa, trucar al 061 o anar a un centre d'urgències.

4. Quin risc tinc si m'he posat aquesta vacuna?

No s'ha establert una relació de causa-efecte directa ara mateix amb els episodis de trombosi detectats a Europa fins al moment, i l'està estudiant l'Agència Europea de Medicaments. Els casos descrits de relació temporal són 11 sobre 6 milions de vacunes administrades.

5. Tinc efectes secundaris, on he d'anar?

Has de consultar al 061 o al centre d'atenció primària. Si es tracta d'un efecte greu, pots dirigir-te a un centre d'urgències. Si has estat vacunat els darrers 14 dies i tens un mal de cap molt intens, que canvia de forma clara en tombar-te o s'associa a alteracions visuals o altres símptomes neurològics persistents, cal consultar el teu metge o metgessa, trucar al 061 o anar a un centre d'urgències.



Dimarts, 16 de març de 2021

6. No tinc efectes secundaris, m'han de fer un seguiment?

No, no cal. S'han vacunat més de 17 milions de persones amb la vacuna d'Oxford/AstraZeneca i ha mostrat una gran efectivitat per evitar casos greus de la malaltia.

7. Si he de posar-me la vacuna, què haig de fer?

Durant els propers 15 dies, la vacunació està aturada de manera preventiva en espera de la valoració de l'Agència Europea de Medicaments dels casos de trombosi observats. Les dades mostren que és una vacuna amb gran efectivitat per prevenir casos greus de COVID-19. Més de 17 milions de persones s'han posat la vacuna a escala mundial.

8. Tinc programada la primera dosi amb Oxford/AstraZeneca. Què faig?

Totes les cites programades amb la vacuna d'Oxford/AstraZeneca estan cancel·lades. Ara per ara, la vacunació de les persones que estaven programades amb Oxford/AstraZeneca està aturada durant quinze dies a tot l'Estat espanyol.

Anirem informant de les decisions que es prenguin.

Cal esperar a rebre un nou SMS amb les instruccions de represa de la vacunació.

9. No la tinc programada, però sóc d'un col·lectiu prioritzat per vacunar-se que es vacunarà amb la d'Oxford/AstraZeneca. Què passarà? Hauré d'esperar o em posaran una altra vacuna?

Ara per ara, la vacunació de les persones que estaven programades amb Oxford/AstraZeneca està aturada durant quinze dies.

Anirem informant de les decisions que es prenguin.



Dimarts, 16 de març de 2021

Dona't d'alta a [La Meva Salut](#) i comprova que el teu mòbil està correctament enregirat a les dades administratives. Rebràs un SMS amb les instruccions de la vacunació.

10. M'han vacunat amb la 1a dosi d'Oxford/AstraZeneca. Què passa amb la segona?

La segona dosi de la vacuna d'Oxford/AstraZeneca es posa al cap de 12 setmanes de la primera. Hi ha temps perquè l'Agència Europea de Medicaments hagi elaborat el seu informe i s'hagi pres una decisió sobre quina és la millor actitud a prendre.

Anirem informant de les decisions preses.

11. M'he posat les dues dosis d'Oxford/AstraZeneca. De moment no he tingut símptomes. M'he de preocupar? Puc tenir reaccions adverses?

Les dades mostren que és una vacuna amb gran efectivitat per prevenir casos greus de COVID-19. Més de 17 milions de persones s'han posat la vacuna a escala mundial.

12. M'he posat la 1a/2a dosi de la vacuna d'Oxford/AstraZeneca i tinc símptomes. Què he de fer?

Les reaccions adverses amb aquest tipus de vacunes són normalment lleus o moderades, són més freqüents els primers dies i desapareixen al cap d'uns dies després de la vacunació. Un dels símptomes habituals és el mal de cap. Si t'han vacunat durant els darrers 14 dies i tens un mal de cap molt intens, que canvia de forma clara en tombar-te o s'associa a alteracions visuals o altres símptomes neurològics persistents, cal consultar el teu metge o metgessa, trucar al 061 o anar a un centre d'urgències.