

# 2025 Calendari de vacunacions i immunitzacions sistemàtiques



	Infecció per virus respiratori sincicial	Diftèria Tètanus Tos ferina	Poliomielitis	Malaltia per <i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B	Infecció per rotavirus	Malaltia per pneumococ	Malaltia per meningococ	Xarampió Rubèola Parotiditis	Varicel·la	Hepatitis A	Infecció per virus del papil·loma humà	Grip	Herpes zòster
0 mesos	Virus respiratori sincicial <sup>1</sup>													
2 mesos		Hexavalent				Pneumococ conjugada	Meningococ B							
4 mesos		Hexavalent			Rotavirus <sup>2</sup>	Pneumococ conjugada	Meningococ C conjugada	Meningococ B						
6 mesos														
11 mesos		Hexavalent				Pneumococ conjugada							Grip cada any (de 6 a 59 mesos)	
12 mesos							Meningococ conjugada tetravalent (ACWY)	Meningococ B	Triple vírica					
15 mesos										Varicel·la	Hepatitis A			
3 anys									Triple vírica	Varicel·la				
4 anys														
6 anys		DTPa-PI									Hepatitis A			
11-12 anys		dTpa						Meningococ conjugada tetravalent (ACWY) <sup>3</sup>		Varicel·la <sup>4</sup>	Hepatitis A <sup>4</sup>	Virus del papil·loma humà		
Embarassades		dTpa <sup>5</sup>											Grip	
40 anys		Td												
A partir de 60 anys													Grip cada any	
65 anys		Td				Pneumococ conjugada								Herpes zòster <sup>6</sup>
80 anys														Herpes zòster <sup>6</sup>

**1. Immunització de tots els infants menors de 12 mesos**, en la seva primera temporada epidèmica del VRS, de la següent manera: nascuts i nascudes amb anterioritat a l'inici de la temporada epidèmica del VRS (entre abril i setembre), durant el mes de setembre-octubre, i nascuts i nascudes durant la temporada epidèmica de VRS (d'octubre a març), preferentment abans de l'alta al naixement.

**2.** Vacunació contra el **rotavirus** a partir dels 2 mesos d'edat i seguint la pauta segons la vacuna disponible.

**3.** Contra el **meningococ conjugada tetravalent (MACWY)**: s'han de vacunar els adolescents d'11-12 anys d'edat que no hagin rebut cap dosi de la vacuna MACWY a partir dels 10 anys d'edat. També s'ha de fer repesca fins als 18 anys d'edat, inclosos.

**4. Vacuna contra l'hepatitis A (HA) i vacuna contra la varicel·la (V)**: només s'han de vacunar als 11-12 anys els infants no immunitzats (no vacunats o sense antecedents de malaltia) o parcialment vacunats (la pauta vacunal consta de dues dosis).

**5.** S'ha d'administrar la **vacuna dTpa a les embarassades**, en cada embaràs, a partir de les 27 setmanes, preferentment entre les setmanes 27 i 32.

**6.** S'han d'administrar dues dosis de la **vacuna contra l'herpes zòster** a les persones que compleixin 65 anys o 80 anys.

**Nota:** Es recomana la vacunació contra el SARS-CoV-2 cada any durant la campanya de tardor, segons les recomanacions vigents (persones majors de 60 anys i altres amb condicions de risc).