




SI TREBALLES A UN CENTRE SANITARI, COMPROVA EL TEU ESTAT IMMUNITARI

-  2 dosis de vacuna triple vírica documentades
-  Serologia d'IgG +
-  Malaltia documentada

Recorda vacunar-te si no estàs immunitzat correctament

Cal minimitzar el nombre de professionals sanitaris en contacte amb el pacient

Els professionals amb símptomes de xarampió han d'estar exclosos de l'àmbit laboral fins passats 4 dies de l'inici de l'exantema

Més informació

Protocol d'actuació per a la prevenció i el control del xarampió <https://bit.ly/2VoB2el>
 Brot de xarampió: informació per al personal que treballa en centres sanitaris <https://bit.ly/2Jnu2Ni>

Símptomes pacient

- Febre alta (T > 38 °C)
- Exantema maculopapular generalitzat
- Tos
- Conjuntivitis
- Secreció nasal
- Taques de Koplik

Cal proporcionar al pacient una mascareta quirúrgica



En cas de maniobres que generin aerosols, el professional sanitari caldrà que porti una mascareta FFP3



Cal aïllar el pacient de la resta d'usuaris en una habitació o box individual

Mesures d'aïllament per evitar la transmissió per l'aire

Rentat de mans



En entrar i sortir de l'habitació

Mascareta FFP2



Des d'abans d'entrar fins a sortir de l'habitació

Porta



Tancada

Visites



Parlar amb infermeria

Actuacions en el cas

Declaració urgent a l'SVE* < 24 h o a l'SUVEC**


*Servei de vigilància epidemiològica (<http://bit.ly/2p3chY5>)
 ** Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (627480828)

 **Tractament simptomàtic**

 **Aïllament al domicili**

Fins passats 4 dies de l'inici de l'exantema

 **Confirmació del cas (proves de laboratori)**

 **Estudi de contactes**

Mesures de control postexposició si hi estan indicades:
 - Vacuna triple vírica
 - Gammaglobulina inespecífica

