Salut/ Servei Català de la Salut

Generalitat de Catalunya

# Recepta mèdica / ordre de dispensació hospitalària per a la prestació de l'eutanàsia

## Dades del metge o metgessa responsable

Nom* | Primer cognom* | Segon cognom

Número de col·legiat* | Especialitat*

Telèfon de contacte | Nom del centre* | Codi del centre*

## Dades del/de la pacient

Nom* | Primer cognom* | Segon cognom

Codi d'identificació personal (CIP) de la targeta sanitària individual | Edat del/de la pacient* | Pes del/de la pacient*

Número d'expedient*

Data d'aprovació de la Comissió de Garantia i Avaluació* | Data prevista de realització de la prestació* | ☐ Matí ☐ Tarda

## Lloc on es durà a terme la prestació*

☐ Domicili / centre residencial / centre d'atenció intermèdia

☐ Centre hospitalari *(indiqueu el nom del centre)*

## Dades del Servei de Farmàcia Hospitalària que dispensa i entrega la medicació*

En cas que la prestació es produeixi en un centre hospitalari, indiqueu l'hospital.
En cas que la prestació sigui en el domicili, centre residencial o centre d'atenció intermèdia, indiqueu l'hospital de referència del territori on exerceix el metge o metgessa responsable.
En cas de modalitat de medicació autoadministrada per via oral, indiqueu sempre: Hospital Universitari Vall d'Hebron.

## Altres comentaris per al Servei de Farmàcia Hospitalària

## Signatura del metge o metgessa responsable

Localitat* | Data*

**Notes:**

Aquest document té validesa com a recepta mèdica o ordre de dispensació hospitalària a l'efecte de la dispensació dels medicaments indicats en la prestació de l'eutanàsia.

Els camps amb * s'han d'emplenar obligatòriament.

La prestació de l'eutanàsia es defineix com l'acció derivada de proporcionar els mitjans necessaris a una persona que compleix els requisits que preveu la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l'eutanàsia, i que ha manifestat el seu desig de morir. Es sol·licita la dispensació de les unitats dels medicaments prescrits en administració única, seguint la modalitat que s'indica a continuació, d'acord amb el protocol farmacològic de la prestació d'eutanàsia a Catalunya.

☐ L'administració directa al pacient d'una substància per part del professional sanitari competent per via intravenosa (iv). En aquesta modalitat s'han de dispensar 2 *kits* amb la medicació eutanàsica i 1 *kit* amb la medicació de suport.

**Premedicació**

Ansiolític: ☐ midazolam inj.
☐ 5 mg ☐ 10 mg ☐ 15 mg ☐ no

Adjuvants: ☐ lidocaïna inj. 40 mg ☐ sulfat de magnesi inj. 1,5 g (en cas d'al·lèrgia a la lidocaïna) ☐ no

**Inducció del coma**

☐ propofol inj. 1 g ☐ tiopental inj. 2 g (en cas d'al·lèrgia al propofol o manca de disponibilitat)

**Blocador neuromuscular**

☐ rocuroni inj. 200 mg ☐ cisatracuri inj. 30 mg ☐ atracuri inj. 100 mg

Detalleu tot seguit la prescripció del medicament d'inducció del coma i del blocador neuromuscular en cas de dosis diferents a les establertes anteriorment per pes > 150 kg:

☐ **Medicació de suport** (propofol inj. 500 mg o tiopental inj. 1 g / escopolamina inj. 0,5 mg o butilbromur d'escopolamina inj. 20 mg / metoclopramida inj. 10 mg o ondansetró inj. 8 mg / midazolam inj. 5 mg)

☐ La prescripció o el subministrament al pacient per part del professional sanitari d'una substància, de manera que se la pugui autoadministrar per causar la seva pròpia mort.

☐ Via intravenosa (iv). En aquesta modalitat s'han de dispensar 2 *kits* amb la medicació eutanàsica i 1 *kit* amb la medicació de suport.

**Premedicació**

Ansiolítics: ☐ midazolam inj.
☐ 0,5 mg ☐ 1 mg ☐ 2 mg ☐ no

☐ diazepam cpr.
☐ 10 mg ☐ 25 mg ☐ no

Adjuvants: ☐ lidocaïna inj. 40 mg ☐ sulfat de magnesi inj. 1,5 g (en cas d'al·lèrgia a la lidocaïna) ☐ no

**Inducció del coma i mort**

☐ propofol inj. 2 g

**Blocador neuromuscular (administrar si és necessari)**

☐ rocuroni inj. 200 mg ☐ cisatracuri inj. 30 mg ☐ atracuri inj. 100 mg

Detalleu tot seguit la prescripció del propofol i del blocador neuromuscular en cas de dosis diferents a les establertes anteriorment per pes > 150 kg:

☐ **Medicació de suport** (propofol inj. 500 mg / escopolamina inj. 0,5 mg o butilbromur d'escopolamina inj. 20 mg / metoclopramida inj. 10 mg o ondansetró inj. 8 mg / midazolam inj. 5 mg)

☐ Via oral (vo). En aquesta modalitat s'han de dispensar 1 *kit* amb la medicació eutanàsica vo, 1 *kit* amb la medicació eutanàsica iv i 1 *kit* amb la medicació de suport. Així doncs, cal marcar també els medicaments necessaris per a una possible administració intravenosa per part del professional sanitari.

**Premedicació**

Antiemètics *(seleccioneu-ne un)*

☐ metoclopramida cpr. vo 20 mg + ondansetró cpr. 8 mg
☐ ondansetró cpr. 24 mg (en cas d'antecedents a reaccions extrapiramidals o malaltia de Parkinson)

Ansiolític: ☐ diazepam cpr. vo
☐ 10 mg ☐ 25 mg ☐ no

**Inducció del coma i mort**

☐ solució oral de pentobarbital 15% 100 ml

*Inj.: injectable; cpr: comprimits*