

## Traçabilitat del contingut dels *kits* amb la medicació per a la prestació de l'eutanàsia

Aquest document té com a objectiu garantir la traçabilitat en el contingut dels *kits* que contenen la medicació per a la prestació de l'eutanàsia. Els responsables d'emplenar aquest formulari són el farmacèutic o farmacèutica del servei de farmàcia hospitalària i el metge o metgessa responsable.

Sempre s'han de preparar i dispensar dos *kits* amb la medicació eutanàsica (modalitat d'administració per part d'un professional sanitari o modalitat d'autoadministració) i un *kit* amb la medicació de suport.

### Modalitat d'administració de la medicació per part d'un professional sanitari, via intravenosa (iv): KIT PRAM IV – professional sanitari (x 2)

Medicament*	Contingut per <i>kit</i>	Nombre d'ampul·les/vials lliurats**	Nombre d'ampul·les/vials utilitzats‡	Nombre d'ampul·les/vials retornats±
Premedicació				
<b>Midazolam</b>	1 ampul·la 15 mg/3 ml; 3 ml			
<b>Lidocaïna</b>	1 ampul·la 20 mg/ml; 5 ml			
	1 ampul·la 20 mg/ml; 10 ml			
<b>Sulfat magnesi</b>	1 ampul·la 150 mg/ml; 10 ml			
Inducció farmacològica del coma				
<b>Propofol</b>	1 vial 20 mg/ml; 50ml			
<b>Tiopental</b>	4 vials 500 mg			
	2 vials 1 g			
Blocador neuromuscular				
<b>Rocuroni</b>	4 vials 10 mg/ml; 5 ml			
	2 vials 10 mg/ml; 10 ml			
<b>Atracuri</b>	4 ampul·les 10 mg/ml; 2,5 ml			
	2 ampul·les 10 mg/ml; 5 ml			
<b>Cisatracuri</b>	3 ampul·les 2 mg/ml; 5 ml			

\*A títol informatiu, s'han marcat en negreta els medicaments d'ús preferent. Cal recordar que els *kits* han d'incloure només un dels medicaments inductors del coma (propofol o tiopental) i només un tipus de blocador neuromuscular (rocuroni, atracuri o cisatracuri). Els *kits* s'han de preparar d'acord amb la prescripció mèdica i amb la disponibilitat de presentacions dels diferents medicaments al servei de farmàcia hospitalària.

\*\*No s'ha de deixar cap fila en blanc. Cal registrar el nombre d'ampul·les i/o vials lliurats tenint en compte els dos *kits*.

‡No s'ha de deixar cap fila en blanc. Cal registrar el nombre d'ampul·les i/o vials utilitzats per a la prestació de l'eutanàsia.

±No s'ha de deixar cap fila en blanc. Cal registrar el nombre d'ampul·les i/o vials que no s'han utilitzat i que, per tant, es retornen al servei de farmàcia hospitalària, tenint en compte els dos *kits* amb medicació.

**Modalitat d'autoadministració de la medicació per part del mateix pacient per via intravenosa (iv):**  
KIT PRAM IV – autoadministrat (x 2)

Medicament*	Contingut per kit	Nombre d'ampul·les/vials/comprimits lliurats**	Nombre d'ampul·les/vials/comprimits utilitzats‡	Nombre ampul·les/vials / comprimits retornats±
Premedicació				
<b>Midazolam</b>	1 ampul·la 5 mg/5 ml; 5 ml			
<b>Diazepam</b>	1 comprimit 10 mg			
	1 comprimit 25 mg			
<b>Lidocaïna</b>	1 ampul·la 20 mg/ml; 5 ml			
	1 ampul·la 20 mg/ml; 10 ml			
<b>Sulfat magnesi</b>	1 ampul·la 150 mg/ml; 10 ml			
Inducció farmacològica del coma i mort				
<b>Propofol</b>	1 vial 20 mg/ml; 100 ml			
Blocador neuromuscular (si precisa)				
<b>Rocuroni</b>	4 vials 10 mg/ml; 5 ml			
	2 vials 10 mg/ml; 10 ml			
<b>Atracuri</b>	4 ampul·les 10 mg/ml; 2,5 ml			
	2 ampul·les 10 mg/ml; 5 ml			
<b>Cisatracuri</b>	3 ampul·les 2 mg/ml; 5 ml			

\*A títol informatiu, s'han marcat en negreta els medicaments d'ús preferent. Cal recordar que els kits han d'incloure només un tipus de blocador neuromuscular (rocuroni, atracuri o cisatracuri). Els kits s'han de preparar d'acord amb la prescripció mèdica i amb la disponibilitat de presentacions dels diferents medicaments al servei de farmàcia hospitalària.

\*\*No s'ha de deixar cap fila en blanc. Cal registrar el nombre d'ampul·les, vials i/o comprimits lliurats tenint en compte els dos kits.

‡No s'ha de deixar cap fila en blanc. Cal registrar el nombre d'ampul·les, vials i/o comprimits utilitzats per a la prestació de l'eutanàsia.

±No s'ha de deixar cap fila en blanc. Cal registrar el nombre d'ampul·les, vials i/o comprimits que no s'han utilitzat i que, per tant, es retornen al servei de farmàcia hospitalària, tenint en compte els dos kits amb medicació.

**Modalitat d'autoadministració de la medicació per part del mateix pacient per via oral (vo):**  
KIT PRAM ORAL – autoadministrat + KIT PRAM IV – professional sanitari

Cal dispensar un kit amb la medicació eutanàsica oral i un kit intravenós, més el kit amb la medicació de suport.

Medicament*	Contingut per kit	Nombre comprimits/flascó lliurats**	Nombre comprimits/flascó utilitzats‡	Nombre comprimits/flascó retornats±
Premedicació				
<b>Diazepam</b>	1 comprimit 10 mg			
	1 comprimit 25 mg			
<b>Metoclopramida</b>	2 comprimits 10 mg			
<b>Ondansetró</b>	1 comprimit 8 mg			
	3 comprimits 8 mg			
Inducció farmacològica del coma i mort				
<b>Pentobarbital</b>	1 flascó 15%; 100 ml			

\*El kit amb la medicació s'ha de preparar d'acord amb la prescripció mèdica.

\*\*No s'ha de deixar cap fila en blanc. Cal registrar el nombre de comprimits i flascó lliurats al kit.

‡No s'ha de deixar cap fila en blanc. Cal registrar el nombre de comprimits i flascó utilitzats per a la prestació de l'eutanàsia.

±No s'ha de deixar cap fila en blanc. Cal registrar el nombre de comprimits i flascó que no s'han utilitzat que es retornen al servei de farmàcia hospitalària.

Medicament*	Contingut per kit	Nombre d'ampul·les/vials lliurats**	Nombre d'ampul·les/vials utilitzats‡	Nombre d'ampul·les/vials retornats±
<b>Premedicació</b>				
<b>Midazolam</b>	1 ampul·la 15 mg/3 ml; 3 ml			
<b>Lidocaïna</b>	1 ampul·la 20 mg/ml; 5 ml			
	1 ampul·la 20 mg/ml; 10 ml			
<b>Sulfat magnesi</b>	1 ampul·la 150 mg/ml; 10 ml			
<b>Inducció farmacològica del coma</b>				
<b>Propofol</b>	1 vial 20 mg/ml; 50 ml			
<b>Tiopental</b>	4 vials 500 mg			
	2 vials 1 g			
<b>Blocador neuromuscular</b>				
<b>Rocuroní</b>	4 vials 10 mg/ml; 5 ml			
	2 vials 10 mg/ml; 10 ml			
<b>Atracuri</b>	4 ampul·les 10 mg/ml; 2,5 ml			
	2 ampul·les 10 mg/ml; 5 ml			
<b>Cisatracuri</b>	3 ampul·les 2 mg/ml; 5 ml			

\*A títol informatiu, s'han marcat en negreta els medicaments d'ús preferent. Cal recordar que el *kit* ha d'incloure només un dels medicaments inductors del coma (propofol o tiopental) i només un tipus de blocador neuromuscular (rocuroní, atracuri o cisatracuri). El *kit* s'ha de preparar d'acord amb la prescripció mèdica i amb la disponibilitat de presentacions dels diferents medicaments al servei de farmàcia hospitalària.

\*\*No s'ha de deixar cap fila en blanc. Cal registrar el nombre d'ampul·les i/o vials lliurats al *kit*.

‡No s'ha de deixar cap fila en blanc. Cal registrar el nombre d'ampul·les i/o vials utilitzats per a la prestació de l'eutanàsia.

±No s'ha de deixar cap fila en blanc. Cal registrar el nombre d'ampul·les i/o vials que no s'han utilitzat i que es retornen al servei de farmàcia hospitalària.

## Medicació de suport en cas de complicacions: KIT AMB LA MEDICACIÓ DE SUPORT

*Independentment de la modalitat de prestació, sempre cal dispensar un kit amb la medicació de suport.*

Medicament*	Contingut per kit	Nombre d'ampul·les/vials lliurats**	Nombre d'ampul·les/vials utilitzats‡	Nombre d'ampul·les/vials retornats±
Midazolam	2 ampul·les 15 mg/3 ml; 3 ml			
Propofol	1 vial 10 mg/ml; 50 ml			
<b>Tiopental</b>	2 vials 500 mg			
	1 vial 1 g			
Escopolamina	1 ampul·la 0,5 mg/ml; 1 ml			
Butilbromur escopolamina	1 ampul·la 20 mg/ml; 1 ml			
Metoclopramida	1 ampul·la 10 mg/2 ml; 2 ml			

\*Cal recordar que el *kit* ha d'incloure només un dels medicaments inductors del coma (propofol o tiopental) i només un tipus de fàrmac per a la ranera. El *kit* amb la medicació s'ha de preparar d'acord amb la prescripció mèdica i amb la disponibilitat de presentacions dels diferents medicaments al servei de farmàcia hospitalària.

\*\*No s'ha de deixar cap fila en blanc. Cal registrar el nombre d'ampul·les i/o vials lliurats al *kit*.

‡No s'ha de deixar cap fila en blanc. Cal registrar el nombre d'ampul·les i/o vials utilitzats per a complicacions durant el procediment de l'eutanàsia.

±No s'ha de deixar cap fila en blanc. Cal registrar el nombre d'ampul·les i/o vials que no s'han utilitzat i que es retornen al servei de farmàcia hospitalària.

## Informació sobre la dispensació

Data a partir de la qual es pot recollir la medicació (*indiqueu-la en format DD/MM/AAA*)

Horari (*escolliu una opció*)

matí       tarda

Lloc de recollida de la medicació

Nom del centre

Adreça postal

Signatura del farmacèutic/a responsable  
de la dispensació de la medicació

Signatura del metge/essa responsable  
que rep la medicació

Data

Data

## Informació sobre el retorn de la medicació

El retorn de la medicació sobrant al servei de farmàcia hospitalària que ha dispensat la medicació es fa seguint el procés invers a la dispensació i el lliurament. Seleccioneu l'opció:

- Servei de Farmàcia Hospitalària (de l'hospital de referència del territori del metge o metgessa responsable)
- Lliurament via intermediari de proximitat (ha d'existir un proveïdor de servei de transport autoritzat pel Departament de Salut i seguir el [Document de bones pràctiques per al lliurament de proximitat de la medicació hospitalària de dispensació ambulatoria \[MHDA\]](#))

Signatura del metge/essa responsable  
que registra la medicació utilitzada  
i retorna la medicació sobrant

Signatura del farmacèutic/a responsable  
que rep la medicació sobrant

Data

Data